

V.วิธีใช้ วิธีรับประทานยา 薬の飲み方・使い方

วันละ 3 ครั้ง / 2 ครั้ง / 1 ครั้ง	ก่อนอาหาร	ระหว่างมื้ออาหาร
1日3回 / 2回 / 1回	食前	食間
เช้า กลางวัน เย็น / เช้าเย็น / เช้า หรือ เย็น	หลังอาหาร	ก่อนนอน
朝・昼・夕 / 朝・夕 / 朝又は夕	食後	就寝前
	เวลาที่ปวดหรือเจ็บ	เวลามีไข้
	痛むとき	熱のあるとき

ใช้ยานี้เมื่อมีอาการต่อไปนี้(ยาใช้ภายใน)

次の症状の時飲んでください(内用)

เวลามีไข้
熱のある時
เวลาปวด
痛い時
เวลาท้องผูก
便秘の時
เวลาคัน
かゆい時

เวลาไอ
咳の出る時
เวลานอนไม่หลับ
眠れない時
เวลามีอาการ
発作の時
เวลาท้องเสีย
下痢の時

ใช้ยานี้เมื่อมีอาการต่อไปนี้(ยาใช้ภายนอก)

次の症状の時使ってください(外用)

ใช้อม อย่างกลืน (ยาอม)
飲まずになめてください
(トローチ)
ใช้กั้วคอ
うがいをしてください
ใช้ทา
塗ってください

ใช้ทาในปาก
口の中に塗ってください
ใช้แปะ
はってください
ใช้ประคบ
湿布してください